



Program cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika-Slovenská republika
2007-2013

Budujeme partnerstvá

Európska únia

Európsky fond regionálneho rozvoja



Koordinované cezhraničné činnosti ochrany prírody pozdĺž maďarsko-slovenského úseku Dunaja
HUSK/1101/2.2.1/0133

47

Čenkovská lesostep



kosatec piesočný
(*Iris arenaria*)



jesienka piesočná
(*Colchicum arenarium*)

Územie európskeho významu Čenkovská lesostep leží v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny, jej geomorfologickom podcelku Čenkovská niva. Terén je mierne zvlnený s pieskovými dunami, ktoré dosahujú relatívnu výšku 2-3 m. Klimaticky patrí oblasť medzi najteplejšie a najsuchšie na Slovensku. Pôdny kryt tvorí väčšinou čistý jemnozrnný piesok, ktorý je prenášaný vetrom. Vegetácia na takejto pôde má stepný a lesostepný charakter. K vytvoreniu stepných a lesostepných spoločenstiev v minulosti prispeli tradičné formy využívania zeme, najmä pasenie a preháňanie hospodárskych zvierat. Typickými drevinami bývalých pasienkov v lesostepi sú topoľ biely (*Populus alba*) a borievka obyčajná (*Juniperus communis*). V rámci Slovenska ide o jediný výskyt prioritného biotopu európskeho významu Panónske topoľové lesy s borievkou. Územie je mimoriadne významné najmä z fyto geografického hľadiska – niekoľko panónskych endemitov tu dosahuje svoj najsevernejší areál výskytu. V území sa vyskytuje viacero ohrozených a kriticky ohrozených druhov rastlín, napr. kosatec piesočný (*Iris humilis* subsp. *arenaria*), jesienka piesočná (*Colchicum arenarium*), alkana farbiarska (*Alkanna tinctoria*) alebo chvojník dvojklasý (*Ephedra distachya*).



chvojník dvojklasý
(*Ephedra distachya*)



alkana farbiarska
(*Alkanna tinctoria*)



gypsomilka zväzkovitá
(*Gypsophila fastigiata*)



deväťorka rozprestretá
(*Fumana procumbens*)



jesienka piesočná
(*Colchicum arenarium*)



Panónsky topoľový les s borievkou

Faunistický výskum v r. 2004 v NPR Čenkovská step zistil výskyt celkom 9 druhov mäkkýšov. Významný je výskyt pieskomilných rovnokrídlovcov (*Platycleis affinis*, *Dociostaurus brevicollis*, *Myrmeleotettix antennatus*, *Omocestus petraeus*, *Stenobothrus fischeri*). Charakteristickým druhom je modlivka zelená (*Mantis religiosa*). Z obojživelníkov sú typickými zástupcami skokan dlhonohý (*Rana dalmatina*), hrabavka škvrnitá (*Pelobates fuscus*) a ropucha bradavičnatá (*Bufo bufo*). Z plazov sa vyskytuje jašterica bystrá (*Lacerta agilis*), jašterica zelená (*Lacerta viridis*). Z vtákov boli v území pozorované bocian čierny (*Ciconia nigra*), orliak morský (*Haliaeetus albicilla*), včelár lesný (*Pernis apivorus*), tesár čierny (*Dryocopus martius*), ďateľ prostredný (*Dendrocopos medius*), lelek lesný (*Caprimulgus europaeus*). Z cicavcov sa potvrdil výskyt mačky divej (*Felis silvestris*) a ucháča sivého (*Plecotus austriacus*). Lokalita je však ohrozená zánikom unikátnych biotopov v dôsledku drastických zmien v spôsoboch využívania krajiny. Najzávažnejšie príčiny jej ohrozenia spočívajú v pozastavení pastvy hospodárskych zvierat v území a v nevhodnom spôsobe lesného hospodárenia, ktorým došlo k poškodeniu a zničeniu rozsiahlych plôch s výskytom unikátnych biotopov (umelé zalesnenie pôvodne nelesných biotopov). Pridruženými javmi sú invázie a rozširovanie nepôvodných druhov drevín ako borovica lesná (*Pinus sylvestris*), agát biely (*Robinia pseudoaccacia*), pajaseň žliazkatý (*Ailanthus altissima*), brestovec západný (*Celtis occidentalis*) alebo z bylín zlatobyľ (*Solidago* sp.) alebo podsľečník Theofrastov (*Abutilon theophrasti*). Sukcesným zarastaním územia sa zmenšuje vzácny biotop panónskych topoľových lesov s borievkou a postupne zaniká predmet ochrany.

kavyl' vláskovitý
(*Stipa capillata*)



jašterica bystrá
(*Lacerta agilis*)



modlivka zelená
(*Mantis religiosa*)



pajaseň žliazkatý
(*Ailanthus altissima*)



zlatobyľ
(*Solidago* sp.)

