



Program cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika-Slovenská republika
2007-2013

Budujeme partnerstvá

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



Koordinované cezhraničné činnosti ochrany prírody pozdĺž maďarsko-slovenského úseku Dunaja
HUSK/1101/2.2.1/0133

37

Čičovské luhy



Čičovské luhy vo 4. časti CHKO Dunajské luhy sú územím európskeho významu. Predmetom ochrany na tejto lokalite sú biotopy európskeho významu, lužné lesy, mokraďové a vodné biotopy s výskytom rastlín a živočíchov európskeho i národného významu. Územie je v súčasnosti relatívne najstarším biotopom močiarnych porastov v celej Čičovskej oblasti, ktorý je výsledkom postupného zazemňovania pôvodného dunajského ramena. Zachovali sa tu zvyšky vzácnej močiarnnej biocenózy, najstaršej v celej sérii postupne zazemňovaných dunajských ramien.

Ústrednú časť Čičovských luhov tvorí NPR Čičovské mŕtve rameno, s výskytom vodných a močiarnych biotopov (viď virtuálny panel 22 - Čičovské mŕtve rameno). Súčasťou Čičovských luhov sú aj Hamské trstiny predstavujúce značne zazemnené pôvodné dunajské rameno s depresiami močiarného charakteru. Stredom Hamských trstín prechádza Hamský kanál s pomerne stálou hladinou vody, ktorý je náleziskom blatniaka tmavého (*Umbra krameri*), kriticky ohrozeného chráneného druhu európskeho významu. Tento náš pôvodný druh nežije nikde inde na svete (je endemitom podunajskej oblasti). V Hamskom kanáli rastú chránené rastliny - perutník močiarny (*Hottonia palustris*), iskerník veľký (*Ranunculus lingua*), leknó biele (*Nymphaea alba*), leknica žltá (*Nuphar lutea*) a bublinatka obyčajná (*Utricularia vulgaris*). Ústrednú časť vegetačného krytu tvoria husté porasty trste obyčajnej (*Phragmites australis*) a vysokých ostríc (*Magnocaricetea*), ktoré vytvárajú vhodné prostredie pre výskyt glaciálneho reliktu hraboša severského panónskeho (*Microtus oeconomus méhelyi*), ktorý je chráneným druhom európskeho významu. Hraboš severský uprednostňuje stanovištia s pravidelným vodným



plamienok celistvolistý
(*Clematis integrifolia*)



vodnianka žabia (*Hydrocharis morsus-ranae*)




iskerník veľký (*Ranunculus lingua*)

režimom a súvislým porastom vlhkomilnej vegetácie (prevažne ostríc - *Carex* sp.), ktorý v zamokrenom teréne vytvára vyvýšené útvary – tzv. buly. Trstinový zárasť prechádza v mokrú lúku so solitérmi domácich druhov vrb (*Salix*) a topoľov (*Populus*) s výskytom chránených rastlín ako napr. plamienok celistvolistý (*Clematis integrifolia*), graciola lekárska (*Gratiola officinalis*), starček barinný (*Senecio paludosus*), skorocel najvyšší (*Plantago altissima*), ďalej zraniteľných a ohrozených druhov ako žltuška žltá (*Thalictrum flavum*), bezkolenec belasý (*Molinia caerulea*) a cesnak hranatý (*Allium angulosum*). Na rozsiahlom území Čičovských luhov rastie aj chránený druh európskeho významu pichliač úzkolistý (*Cirsium brachycephalum*).



perutník močiarny (*Hottonia palustris*)

Významnú časť Čičovských luhov tvoria lužné lesy, ktoré sú typické pre oblasť Podunajska a Žitného ostrova. Sú to porasty tvrdého lužného lesa, napr. lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek a tiež mäkkého lužného lesa - lužné vrbovotopoľové a jelšové lesy v záplavovom území rieky Dunaj. V drevinovej skladbe mäkkých lužných lesov prevládajú predovšetkým vrba biela (*Salix alba*), vrba krehká (*Salix fragilis*), topoľ biely (*Populus alba*) a topoľ čierny (*Populus nigra*) v podrade s výskytom bledule letnej (*Leucojum aestivum*). V tvrdých lužných lesoch dominujú najmä dub letný (*Quercus robur*), brest väzový (*Ulmus laevis*), brest hrabolistý (*Ulmus minor*), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*) a úzkolistý (*F. angustifolia*) v podrade s výskytom kriticky ohrozeného viniča lesného (*Vitis sylvestris*).



blatniaka tmavého (*Umbra krameri*)

Do územia Čičovských luhov zasahuje aj chránené vtáčie územie Dunajské luhy, ktoré je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie orliaka morskeho (*Haliaeetus albicilla*), volavky striebristej (*Egretta garzetta*), haje tmavej (*Milvus migrans*), bučičika močiarného (*Ixobrychus minutus*), čajky čiernohlavej (*Larus melanocephalus*), rybára riečneho (*Sterna hirundo*) a rybárika riečného (*Alcedo atthis*). Z národného pohľadu je lokalita veľmi významná pre hniezdenie vodného vtáctva, napr. kalužiaka červenonohého (*Tringa totanus*), hrdzavky potápavej (*Netta rufina*) a kačice chriplavej (*Anas strepera*). V území pravidelne zimuje alebo migruje potápač biely (*Mergus albellus*), chochlačka vrkočatá (*Aythya fuligula*), chochlačka sivá (*Aythya ferina*) a hlaholka severská (*Bucephala clangula*). Pravidelne tu hniezdi populácia bociana čierneho (*Ciconia nigra*), kane močiarnej (*Circus aeruginosus*) a brehule hnedej (*Riparia riparia*).