



Program cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika-Slovenská republika
2007-2013

Budujeme partnerstvá

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



Koordinované cezhraničné činnosti ochrany prírody pozdĺž maďarsko-slovenského úseku Dunaja
HUSK/1101/2. 2. 1/0133

33

Dolnovážske luhy



Lokalita sa nachádza severozápadne od mesta Komárno, na pravostrannom brehu Váhu, cca. 1, 5 km na SZ od NPR Apálsky ostrov. Územie tvorí lúčno-mokradový komplex s lesnými porastmi s charakterom mäkkých lužných lesov v inundačnom území rieky Váh. Ide o aktívne alúvium Váhu s mäkkým lužným lesom a fragmentmi kosených lúčnych spoločenstiev. Z biotopov sú zastúpené periodicky zaplavované porasty aluviálnych nížinných lúk, ďalej fragmenty nížinných vrbovo-topoľových lužných lesov a formácie so zastúpením domácich druhov vrb (*Salix alba*, *Salix cinerea*, *Populus nigra*, *Populus x canescens*). V poľnohospodárskej krajine má táto oblasť neoceniteľný význam.

Vegetáciu územia tvoria spoločenstvá aluviálnych a nížinných lúk s fragmentmi lužného vrbovo-topoľového lužného lesa. Zaznamenaných tu bolo viac ako 150 druhov rastlín, z chránených druhov napr. ostrica čiernoklasá (*Carex melanostachya*), plamienok celistvolistý (*Clematis integrifolia*), šašina prímorská (*Bolboschoenus maritimus*), pálčivka žilkatá (*Cnidium dubium*), kotúč modrastý (*Eryngium planum*), graciola lekárska (*Gratiola officinalis*), skorocel najvyšší (*Plantago altissima*), štiavec úzkolistý (*Rumex stenophyllus*), žltuška žltá (*Thalictrum flavum*) a mliečnik lesklý (*Tithymalus lucidus*), hrdobarka cesnaková (*Teucrium scordium*).

Územie Dolnovážskych luhov patrí do lesného celku Komárno. V území sa nachádzajú predovšetkým lesy hospodárske, vekové zloženie jednotlivých porastov je značne rôznorodé. Z drevín majú dominantné zastúpenie dreviny mäkkých a prechodných lužných lesov, ako sú topoľ čierny (*Populus nigra*), topoľ biely (*Populus alba*), topoľ sivý (*P. x canescens*), vrb biela (*Salix alba*), vrb krehká (*Salix fragilis*) a bresty, najmä brest väzový (*Ulmus laevis*).

Fauna územia je charakteristická výskytom druhov viazaných na biotopy mokradového charakteru (močiarne porasty s periodickým zaplavovaním), okrajové sprievodné lúčne biotopy a formácie solitérnych krov a drevín (ako napr. *Salix cinerea*, *Populus nigra*, *Populus x canescens*). Z motýľov tu bolo zaznamenaných 82 druhov, z obojživelníkov (*Amphibia*) sa v území vyskytuje celkom 12 druhov,



plamienok celistvolistý
(*Clematis integrifolia*)



skorocel najvyšší
(*Plantago altissima*)



ako napr. napríklad hrabavka škvrnitá (*Pelobates fuscus*) a rosnička zelená (*Hyla arborea*). Z ropúch sa vyskytuje ropucha zelená (*Bufo viridis*) a ropucha bradavičnatá (*Bufo bufo*). Z druhov európskeho významu sa pravidelne vyskytuje a rozmnožuje kunka červenobruchá (*Bombina bombina*). Z plazov (*Reptilia*) sú v území prítomné 4 druhy napr. užovka obojková (*Natrix natrix*) a jašterica krátkohlavá (*Lacerta agilis*). Z vtákov (*Aves*) sa na predmetnom území vyskytuje minimálne 96 druhov, pričom významnými hniezdičmi (zároveň druhmi európskeho významu) sú druhy, ktoré obľubujú biotopy mokraďového charakteru – napr. kaňa močiarna (*Circus aeruginosus*). Z európsky významných hniezdičov sa ďalej vyskytuje napr. strakoš obyčajný (*Lanius collurio*), penica jarabá (*Sylvia nisoria*), ďalej včelár lesný (*Pernis apivorus*), z európsky významných brodivcov napr. bocian čierny (*Ciconia nigra*), bocian biely (*Ciconia ciconia*), chavkoš nočný (*Nycticorax nycticorax*) a ďalšie druhy. Z národne významných druhov hniezdiacich na lokalite možno uviesť svrčiaka slávikovitého (*Locustella luscinioides*), prhlviara čiernohlavého (*Saxicola torquata*), trasochvosta žltého (*Motacilla flava*), strnádku lúčnu (*Emberiza calandra*), strnádku trstinovú (*Emberiza schoeniclus*) viazané hniezdením na mokraďové a lúčne porasty v území. V minulosti na lokalite hniezdil vzácny európsky významný druh slávika – slávik modrák (*Luscinia svecica*). V zimnom období sa v území vyskytuje európsky významná kaňa sivá (*Circus cyaneus*), myšiak severský (*Buteo lagopus*) a strakoš veľký (*Lanius excubitor*). Z cicavcov (*Mammalia*) bol zistený výskyt minimálne 15 druhov, z chránených druhov európskeho významu sa vyskytuje napr. škrečok poľný (*Cricetus cricetus*) a v minulosti i syseľ pasienkový (*Spermophilus citellus*).



bocian čierny
(*Ciconia nigra*)



ropucha zelená
(*Bufo viridis*)



syseľ pasienkový
(*Spermophilus citellus*)