





Lesopark Pomlé v Šamoríne



Mestský park Pomlé na severnom okraji mesta predstavuje najviac zachovalú časť pôvodnej vegetácie na území mesta Šamorín. Park predstavuje morfológicky najstarší prvok dnešného reliéfu Žitného ostrova so znakmi riečneho a eolického vývoja. Jedná sa o bývalý meander, zotretý činnosťou vetra a človeka, v jednej časti s pomerne zachovalým profilom starého meandra Dunaja. Jadro parku má rozlohu 11 ha a je tvorené zaujímavými a druhovo bohatými biocenózami, napr. dubovo-brestovo-jaseňovým lužným lesom, trnkovými krovínami, poloprirodnými lúkami a vysadenými kultúrami borovice čiernej. Stromovú vegetáciu tvorí prevažne spoločenstvo tvrdého lužného lesa v pôvodnom drevinovom zložení. V parku sa vyskytuje 44 druhov drevín, medzi nimi 165 ks dubov.

Dnes je táto lokalita mozaikou biotopov, kde sa striedajú vlhšie fragmenty topoľového lužného lesa (*Corydalis cava*, *Scilla vindobonensis*) so slnečnými a suchšími čistinkami (s chránenou modricou nebadanou - *Muscari neglectum*, nátržníkom piesočným - *Potentilla arenaria*). V bylinnej vegetácii parku sa už len v malej miere prejavuje pôvodná prirodzená štruktúra (*Ficaria bulbifera*), častý je výskyt kozmopolitných druhov ako sedmokráska (*Bellis perennis*), skorocel kopijovitý (*Plantago lanceolata*) alebo aj archeofytov (nepôvodných druhov zavlečených v minulosti) ako bolehlav škvrnitý (*Conium maculatum*). Podľa mapovania v roku 2013 sa tu vyskytuje 49 druhov bylín, medzi nimi vyniká chránená bledavka Boucheova (*Ornithogalum boucheanum*) a snežienka jarná (*Galanthus nivalis*). Na svoje si prídu zberači bylín a liečivých rastlín, rastie tu napr. šalvia lúčna (*Salvia pratensis*), repík lekársky (*Agrimonia eupatoria*), zádušník brečtanovitý (*Glechoma hederacea*) alebo zbehovec plazivý (*Ajuga reptans*).

Avifauna lokality je charakterizovaná predovšetkým lesnými druhmi ako ďateľ (ďateľ prostredný - *Dendrocopos medius* a ďateľ veľký - *Dendrocopos major*), kukučka (*Cuculus canorus*), sýkorka belasá (*Parus caeruleus*), myšiarka ušatá (*Asio otus*), sokol myšiar (*Falco tinnunculus*) a množstvo spevavcov - drozd čierny (*Turdus merula*), pinka obyčajná (*Fringilla coelebs*), oriešok obyčajný (*Troglodytes troglodytes*), kôrovník krátkoprstý (*Certhia brachydactyla*) a brhlík obyčajný (*Sitta europaea*). Z bezstavovcov tu žijú napr. májka obyčajná (*Meloe proscarabeus*), roháč obyčajný (*Lucanus cervus*); typická je cifruša bezkrídla (*Pyrrhocoris apterus*) a motýle ako žltáček rešetliakový (*Gonepteryx rhamni*), babôčka admirálska (*Vanessa atalanta*) a babôčka pávooká (*Inachis io*). Stavovce sú zastúpené skokanom štíhlým (*Rana dalmatina*), jaštericou obyčajnou (*Lacerta agilis*), ježom tmavým (*Erinaceus europaeus*), krtom (*Talpa europaea*) alebo ryšavkou obyčajnou (*Apodemus sylvaticus*).

Hoci nie je chráneným územím, význam tohto parku stúpol po výstavbe Vodného diela Gabčíkovo. V dôsledku výstavby stratilo mesto až 600 hektárov lužného lesa a okrem 5-hektárovej plochy pri Dunaji je v súčasnosti Pomlé jediným lesom v katastri.



skokan štíhly
(*Rana dalmatina*)